



## Инструкция

по медицинскому применению препарата

### Вагинорм-С® Vaginorm-C

**Регистрационный номер:** ЛСР-005889/08

**Торговое название:** Вагинорм-С®

**Международное непатентованное название:** аскорбиновая кислота

**Лекарственная форма:** таблетки вагинальные

**Состав в 1 вагинальной таблетке:**

**Активное вещество:** аскорбиновая кислота 250 мг

**Вспомогательные вещества:** полиметилсилоксан 10 мг, лактозы моногидрат 670 мг, гипромеллоза 60 мг, магния стеарат 10 мг.

**Описание**

Овальные таблетки от белого до белого со светло-желтым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое

**Код АТХ :** G01AD03

**Фармакологическое действие**

Аскорбиновая кислота снижает pH влагалища, ингибируя рост бактерий и способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей pH и флоры влагалища (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

Таким образом, при снижении pH влагалища в течение нескольких дней происходит выраженное подавление роста анаэробных бактерий, а также восстановление нормальной флоры (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

**Фармакокинетика**

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве, выводится через почки.

**Показания**

- Хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой (вследствие измененного pH влагалища).

- Для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

**Противопоказания**

- Гиперчувствительность к любому из компонентов;

- Кандидозный вульвовагинит.

**Применение при беременности и лактации**

Не противопоказан во время беременности и лактации.

**Способ применения и дозы**

Интравагинально. 1 вагинальную таблетку вводят во влагалище лежа на спине при слегка согнутых ногах 1 раз вечером перед сном. Курс лечения составляет 6 дней. Возможны повторные курсы лечения.

При необходимости курс терапии возможно продлить на более длительный срок.





#### **Побочное действие**

Препарат хорошо переносится.

Очень редко (<1/10000)- гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.  
Редко (< 1/100, ≥ 1/1000 случаев) возможно жжение или зуд во влагалище, усиление слизистых выделений, гиперемия, отечность вульвы.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Салицилаты стимулируют процесс выведения витамина С из организма. Эстрогены улучшают биодоступность витамина С. Витамин С снижает активность антикоагулянтов.

#### **Особые указания**

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища.

Перерывы в применении Вагинорма-С в связи с межциклическими или менструальными кровотечениями не обязательны.

Витамин С изменяет картину содержания глюкозы в моче, так же как и картину содержания трансаминаз, лактата дегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови.

Такие проявления, как жжение и зуд могут быть обусловлены наличием сопутствующей асимптоматической грибковой инфекции. Поэтому при появлении данных симптомов следует провести анализ для исключения грибковой инфекции.

#### **Форма выпуска**

Вагинальные таблетки 250 мг. По 6 вагинальных таблеток в блистер из ПВХ-ПВДХ/Ал. По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.



#### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности указанного на упаковке.

#### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25°C.  
В недоступном для детей месте.

#### **Условия отпуска из аптеки**

Без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

Полихем С.А.  
50, Валь Флери, L- 1526, Люксембург

#### **Производитель**

Артезан Фарма ГмбХ и Ко.КГ,  
Вендландштрассе 1, 29439 Люхов, Германия

#### **Претензии по качеству направлять по адресу**

ООО «Эбботт Продактс»  
119334, Россия, Москва,  
ул. Вавилова, д.24  
Тел.: +7 (495) 411-69-11  
Факс: +7 (495) 411-69-10  
info@abbottproducts.ru



Druck-Nr.: 07/10

